

Principio activo	Semivida (h)*	Dosis equivalentes (mg)**
Acción ultracorta (< 6 horas)		
Bentazepam (Tiadipona®)	2 – 5	25
Brotizolam (Sintonal®)	3 – 8	0,25
Medazepam [†] (Nobritol®)	2	5 mg
Midazolam (Dormicum®...)	1 – 5	7,5
Triazolam (Halción®)	3 – 5	0,125 – 0,25
Zolpidem (Stilnox®, Dalparan®..)	2 – 3	10 mg
Zopiclona (Limovan®...)	3 – 7	7,5 mg
Acción corta (6 – 24 horas)		
Alprazolam (Trankimazin®...)	12 – 15	0,25 – 0,5
Bromazepam (Lexatin®...)	10 – 20	3 – 6
Clotiazepam (Distensan®)	5 – 10	5 mg
Loprazolam (Somnovit®)	4 – 15	0,5 – 1
Lorazepam (Orfidal®...)	11 – 30	0,5 – 1
Lormetazepam (Loramet®...)	11 – 30	0,5 – 1
Oxacepam** (Adumbran®)	5 – 10	15
Pinazepam (Duna®)	10 – 15	2,5 – 5 mg
Acción larga (> 24 horas)		
Clobazam (Noiafren®)	18	10
Cloracepato dipotásico (Tranxilium®)	30 – 48	7,5
Diazepam (Valium®)	20 – 100	5
Flurazepam (Dormidor®)	24 – 100	15
Ketazolam (Sedotime®)	6 – 25	7,5
Quazepam (Quiedorm®)	40 – 55	10
Clonazepam (Rivotril®)	18 – 50	0,25 – 0,5

[†]Medazepam solo está comercializado en España como Nobritol®, una asociación a dosis fija con amitriptilina. Se presentan los nombres comerciales de uso más común.

* La semivida media presenta una considerable variabilidad individual.

** Las dosis equivalentes varían según diferentes autores.